

Ueber die
Gewichts-Verhältnisse Neugeborener.

Inaugural-Dissertation

der

Hohen Medizinischen Facultät der Universität München

unter dem Präsidium des Herrn Prof. Dr. Bollinger

vorgelegt von

Felix Wolff

approb. Arzt

aus Hamburg.

München.

Königl. Hof-Buchdruckerei von E. Muhlthaler.

1883.

Herrn
Professor Dr. Bischoff in Basel
in
dankbarer Ergebenheit
gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554602_0210

Die Gewichtsveränderungen Neugeborner erregen das Interesse der Geburtshelfer seit mehreren Jahrzehnten in hohem Grade und seitdem in den 30er Jahren zum ersten Male Burdach und Chaussier die Beobachtung einer vorübergehenden Gewichtsabnahme in den ersten Lebenstagen veröffentlichten, ist die Literatur über diesen Gegenstand zu stattlichem Umfang herangewachsen. Schon bald nach den Veröffentlichungen jener Forscher führte Quetelet¹⁾ die ersten regelmässigen Wägungen an Neugeborenen aus und heutzutage ist die Bedeutung täglicher, regelmässiger Gewichtsbestimmungen in den ersten Lebenswochen der Kinder in physiologischer wie hygienischer Beziehung eine unbestrittene.

Quetelet's Beispiel fand zahlreiche Nachahmung und französische wie deutsche Geburtshelfer suchten durch regelmässige Wägungen zu erforschen, nach welchen Gesetzen Gewichtsabnahme und Zunahme des Neugeborenen erfolgen, welche Lebensbedingungen von Wichtigkeit dafür sind.

In der Arbeit des Genfer Forschers Dr. Odier,²⁾ sowie in der Inaugural-Dissertation von Dr. Altherr³⁾ in Basel finden wir eine gründliche Besprechung der bezüglichen Literatur und namentlich in der Abhandlung des Letzteren ist das Historische

¹⁾ Quetelet, *Physique sociale ou Essai sur le développement des facultés de l'homme*. Bruxelles 1835.

²⁾ Odier, *Recherches sur la loi d'accroissement des nouveau-nés, constaté par le système des pesées régulières et sur les conditions d'un bon allaitement*. Paris 1866.

³⁾ Altherr, *Ueber regelmässige tägliche Wägungen der Neugeborenen*. Inaug.-Dissert. Basel 1874.

über Wägungen bei Neugeborenen in erschöpfender Weise bis zum Jahre 1873 aufgezeichnet. Wir sehen, dass ausser den genannten französischen Autoren Chaussier und Quetelet, namentlich noch Bouchaud,¹⁾ sowie Odier und Blache²⁾ sich um die Bedeutung der Wägungen verdient gemacht haben, während bei den Deutschen zuerst von Siebold³⁾ und Breslau⁴⁾ den Gewichtsverhältnissen der Neugeborenen grössere Aufmerksamkeit schenkten. Ihnen folgten zwei Jahre später fast gleichzeitig Haake⁵⁾ und Winckel⁶⁾ mit ihren Untersuchungen, diesen Arbeiten wiederum die vergleichenden Studien Kehler's⁷⁾ und Edlefsen's⁸⁾ bei neugeborenen Thieren. Als letzte Arbeit über Wägungen nennt Altherr endlich die Abhandlung Gregory's,⁹⁾ der durch seine Statistik Haake's und Winckel's Forschungen zu vervollständigen strebte.

Wir haben nun dieser Reihe von Veröffentlichungen noch diejenige von Altherr selbst, sowie die Untersuchungen Kéz-

¹⁾ Bouchaud, De la mort par inanition et études expérimentales sur la nutrition chez les nouveau-nés. Paris 1864.

²⁾ Odier et Blache, Quelques considérations sur les causes des nouveau-nés. Paris 1866.

³⁾ von Siebold, Ueber die Gewichts- und Längenverhältnisse der neugeborenen Kinder, über die Verminderung ihres Gewichts in den ersten Tagen und die Zunahme desselben in den ersten Wochen nach der Geburt. Monatsschr. für Geb.-Kunde. Bd. XV S. 337. 1860.

⁴⁾ Breslau, Ueber die Veränderungen im Gewichte der Neugeborenen. Monatsschr. für Geb.-Kunde. Bd. XVI S. 75. 1860.

⁵⁾ Haake, Ueber die Gewichts-Veränderungen der Neugeborenen. Monatsschr. für Geb.-Kunde. Bd. XIX S. 339. 1862.

⁶⁾ Winckel, Untersuchungen über die Gewichts-Verhältnisse bei 100 Neugeborenen in den ersten zehn Tagen nach der Geburt. Monatsschr. für Geb.-Kunde. Bd. XIX S. 416. 1862.

⁷⁾ Kehler, Ueber die Ursachen der Gewichts-Veränderungen Neugeborner. Arch. für Gynäkol. Bd. I. Berlin 1870.

⁸⁾ Edlefsen, Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf das Wachsthum und des Wachsthum auf Zahl und Gewicht der Jungen. Kiel 1868. Inaug.-Dissert. S. 11. — Edlefsen, Beitrag zur Kenntniss der Gewichts-Verhältnisse neugeborner Säugethiere. Arch. für Gynäkol. Bd. I. 1870.

⁹⁾ Gregory, Ueber die Gewichts-Verhältnisse der Neugeborenen. München (ohne Jahreszahl)

márszky's¹⁾ hinzuzufügen, die kurz hintereinander in den Jahren 1873 und 1874 gefolgt sind. Seitdem ist Neues von Wichtigkeit auf dem Gebiete der Gewichts-Verhältnisse Neugeborner nicht erschienen und obwohl Hesse's Tabellen²⁾ über Gewicht und Messung der Körperlänge bei einem Kinde im ersten und zweiten Lebensjahre hier Erwähnung finden mögen, so haben dieselben doch keinen wesentlichen Einfluss noch Bedeutung für unseren Gegenstand.

Wenn nun trotz des Reichthums der Literatur in dem Gebiete der Kinderwägungen ich mich berechtigt fühle, eine neue Arbeit in diesem Zweige der Geburtshülfe zu veröffentlichen, so geschieht es, weil manche Punkte trotz aller Publicationen noch der Aufklärung bedürfen, keiner meiner Vorgänger aber ein so reiches Material zum statistischen Nachweise verwandte, wie es mir durch die Güte des Herrn Professor Bischoff in Basel zur Verfügung gestellt ist.

I. Das Material für die Statistik.

Seit dem Sommer 1868 wurden in der Gebär-Abtheilung des Baseler Spitales unter Leitung des Herrn Professor Bischoff sämtliche Neugeborene täglich regelmässig gewogen und diese Wägungen während des ganzen Spitalaufenthaltes fortgesetzt. Die Wägungsergebnisse nun aus den Jahrgängen 1868 bis 1873 (im Januar) benutzte Altherr zu der mehrfach citirten Arbeit, mir aber wurden die Wägungstabellen von 1873 bis 1882 incl. übergeben, so dass meine Statistik eine weit bedeutendere Anzahl Neugeborner umfasst.

Des Vergleiches wegen sei es mir gestattet, in der Eintheilung meiner Arbeit genau dem Vorgange Altherr's zu folgen und in meinen Untersuchungen seine Eintheilung mir möglichst zu eignen zu machen.

¹⁾ Kézmárszky, Ueber die Gewichts-Veränderungen reifer Neugeborner. Arch. für Gynäkol. Bd. V S. 547. 1873.

²⁾ Im Archiv für Gynäkologie. Bd. XIV S. 491. 1879. Bd. XVII S. 151. 1881.

Es wurden nun in dem Zeitraume von 1873 (Mitte Juni) bis Ende 1882 im Baseler Spital täglichen Wägungen unterzogen :
2212 Kinder.

Allein da von dieser Anzahl alle diejenigen in Wegfall kommen, deren Initialgewicht aus irgend einem Grunde nicht zu bestimmen war, ferner diejenigen nicht mitgerechnet werden, die in den ersten Lebenstagen starben oder wegen Krankheit nur wenige Tage hindurch gewogen wurden, so besteht unsere Statistik nur aus allen den Kindern, an denen mindestens fünf tägliche Wägungen ausgeführt wurden.

Daher beträgt die Zahl der Kinder, mit der wir zu rechnen haben :

2032 Kinder
nämlich 1019 Knaben
1013 Mädchen.

Ferner finden wir darunter:

413 Knaben von primiparen Müttern
606 Knaben von multiparen Müttern

1019.

400 Mädchen von primiparen Müttern
613 Mädchen von multiparen Müttern

1013.

Es waren unter den Neugeborenen:

1448 vollständig ausgetragene Kinder
584 nicht vollständig ausgetragene Kinder

2032.

II. Die Art des Wägens.

Die Art des Wägens im Baseler Spital liess Herr Professor Bischoff stets in der bereits von Altherr beschriebenen Weise nach folgenden Regeln ausführen:

- a) Das Initialgewicht wird bei allen Neugeborenen sofort nach der Geburt auf einer kleinen, exacten Decimal-Waage bestimmt.

- b) Alle Neugeborenen werden täglich Morgens zwischen 8 bis 9 Uhr, völlig entkleidet, gewogen.
- c) Die erste Wägung nach der Bestimmung des Initialgewichtes wird an dem Morgen nach dem Geburtstage (bis 12 Uhr Nachts gerechnet) ausgeführt, so dass die Zeit zwischen beiden Bestimmungen 9—33 Stunden als Maximum betragen kann.
- d) Die Wägungen werden bei allen Neugeborenen fortgesetzt bis zum Verlassen des Spitals.

Anknüpfend an diese letzte Regel sei hinzugefügt, dass für die Dauer des Aufenthalts der Neugeborenen im Baseler Spital 14 Tage als Norm angesehen werden müssen; allein es ist die Zahl derer, die diesen Termin im Spital nicht erlebten, weit grösser als derjenigen, die länger als 14 Tage dort verweilten, so dass bei der Zunahme der jährlichen Frequenz eine Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltszeit gegen die früheren Jahre, aus der die Altherr'sche Statistik stammt, angenommen werden muss.

III. Wägungs-Ergebnisse.

Nach Altherr's Vorgang betrachten wir der zeitlichen Entwicklung des Kindes folgend:

- A. Das Initial-Gewicht der Neugeborenen,
- B. Zeitpunkt der Abnahme vom Initial-Gewicht,
- C. Dauer der Abnahme,
- D. Summe der Abnahme,
- E. Erreichen des Initial-Gewichts,
- F. Approximative tägliche Zunahme.

Anhang.

- A. Krankheiten der Mutter,
 - B. Die Art der Nahrung,
- beide in ihren Beziehungen zur Zunahme der Neugeborenen.

A. Das Initial-Gewicht der Neugeborenen.

Unmittelbar nach der Geburt zeigten die Kinder unserer Statistik folgendes Gewicht:

1 000—1 500 gr	1 Kind	=	0,04 ⁰ / ₀
1 500—2 000 gr	20 Kinder	=	0,9 ⁰ / ₀
2 000—2 500 gr	158 „	=	7,8 ⁰ / ₀
2 500—3 000 gr	634 „	=	32,0 ⁰ / ₀
3 000—3 500 gr	846 „	=	42,0 ⁰ / ₀
3 500—4 000 gr	317 „	=	15,0 ⁰ / ₀
4 000—4 500 gr	50 „	=	2,4 ⁰ / ₀
bis 5 000 gr	6 „	=	0,3 ⁰ / ₀

2 032 Kinder.

Hieraus ergibt sich, dass das Initial-Gewicht bei den Neugeborenen in den meisten Fällen, nämlich in 74⁰/₀ aller Fälle, zwischen 2 500—3 500 gr schwankt, die Grenze unter 2 000 gr und über 4 000 gr jedoch nur von 4⁰/₀ aller Neugeborenen überschritten wird.

Betreffs der völlig ausgetragenen Neugeborenen zeigten sich die Gewichtsverhältnisse folgendermassen:

280 Knaben von Primiparen wogen	886 140 gr
1 Knabe von einer Primipara	3 164 gr
474 Knaben von Multiparen wogen	1 541 830 gr
1 Knabe von einer Multipara	3 252 gr
267 Mädchen von Primiparen wogen	808 960 gr
1 Mädchen von einer Primipara	3 026 gr
427 Mädchen von Multiparen wogen	1 380 020 gr
1 Mädchen von einer Multipara	3 232 gr.

Es wogen also zusammen:

die 754 ausgetragenen Knaben	2 427 970 gr
1 ausgetragener Knabe	3 220 gr
die 694 ausgetragenen Mädchen	2 188 980 gr
1 ausgetragenes Mädchen	3 140 gr

und das Gewicht der ausgetragenen Kinder betrug:

1448 Kinder	=	4 616 950 gr
1 Kind	=	3 188 gr.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich in Uebereinstimmung mit allen andern Autoren das höhere Gewicht von Kindern multiparer Mütter und das höhere Gewicht von männlichen Neugeborenen gegenüber weiblichen; dagegen konnte ich Altherr's Behauptung nicht bestätigen, dass die Gewichts-Differenz zwischen Neugeborenen primiparer Mütter und multiparer Mütter bei Knaben eine fast doppelt so grosse sei wie bei Mädchen; ja ich fand im Gegentheil die Differenz zwischen Kindern Multiparer und Primiparer unter den Mädchen weit ausgeprägter.

Das durchschnittliche Körpergewicht ¹⁾ der Neugeborenen stellte sich fast übereinstimmend mit den Angaben Quetelet's und Altherr's dar, jedoch zeigten sich etwas höhere Werthe für Kinder beiderlei Geschlechts und die Gewichtshöhe weniger differirend bei beiden Geschlechtern.

Die Thatsache, dass die nicht vollständig ausgetragenen Kinder geringeres Initial-Gewicht aufweisen, ferner dass die Differenz zwischen Kindern Primiparer und Multiparer bei nicht reifen Kindern geringer ist, findet in folgender Tafel Bestätigung:

Von 584 nicht vollständig ausgetragenen Kindern wogen

133 Knaben von Primiparen	386 850 gr
1 Knabe von einer Primipara	2 908 gr
132 Knaben von Multiparen	370 030 gr
1 Knabe von einer Multipara	2 803 gr
133 Mädchen von Primiparen	389 270 gr
1 Mädchen von einer Primipara	2 929 gr
186 Mädchen von Multiparen	582 200 gr
1 Mädchen von einer Multipara	3 129 gr.

¹⁾ Das durchschnittliche Körpergewicht reifer Kinder beträgt:

nach Siebold	3 250 gr
Hecker	3 275 gr
Ingerslev	3 300 gr
Scanzoni	3 437 gr
Kézmárszky	3 382 gr
Quetelet	3 200 gr
Wolff	3 188 gr

Demnach wogen	265 nicht ausgetragene Knaben	756 880 gr
	1 nicht ausgetragener Knabe	2 865 gr
	319 nicht ausgetragene Mädchen	971 470 gr
	1 nicht ausgetragenes Mädchen	3 035 gr
die	584 nicht ausgetragenen Kinder	1 728 350 gr
	1 nicht ausgetragenes Kind	2 959 gr.

Auffällig ist bei den nicht vollständig ausgetragenen Kindern das höhere Durchschnittsgewicht der Mädchen, eine Erscheinung, die ich nirgends in der Literatur erwähnt finde.

B. Zeitpunkt der Abnahme vom Initial-Gewicht.

Die meisten Geburtshelfer nehmen als Regel an, dass bei Neugeborenen innerhalb der ersten 24 Stunden eine Gewichts-Abnahme stattfindet, sei es auch nur geringster Quantität. Allein bei Breslau und Siebold, sowie bei Bouchaud findet sich die Angabe, dass bei manchen Kindern eine Abnahme überhaupt gar nicht stattfindet oder auch erst nach Verlauf einiger Lebens-tage beginnt; auch Kézsmárszky beobachtete solche Fälle, die er aber auf Ungenauigkeit im Wägen oder auf mangelhafte Ent-leerung des Darms und der Blase zu schieben geneigt war.

Meine Tabellen nun scheinen im Gegensatz zu der gewöhn-lichen Ansicht dafür zu sprechen, dass in der That die Mög-lichkeit einer Abnahme nach mehreren Tagen und auch eine Zunahme in den ersten Tagen statt eine Abnahme möglich ist.

Eine Anzahl von 49 Kindern konnte nicht in die Rubrik derer aufgenommen werden, die nach 24 Stunden an Gewicht abzunehmen begannen und nach einigen Tagen wiederum im Gewicht zunahmen. Diese Anzahl von 49 Kindern (2,4⁰/₀ aller gewogenen Kinder) lässt sich nach Art ihrer Abnahme und Zu-nahme in folgender Weise eintheilen; es zeigten:

1. fortdauernde Abnahme bis zum Tod zwi-	
schen 4.—15. Tag	13 Kinder
2. Beginn der Abnahme erst nach 36—48 Std.	16 „
3. Zunahme am 1. Tag, der dann am 2. resp.	
3. Tag Abnahme folgte	16 „
4. Zunahme ohne spätere Abnahme . . .	4 „
	49 Kinder.

Von vorneherein schliessen wir die erste dieser Klassen aus, weil sich in der fortwährenden Gewichts-Abnahme eines lebensunfähigen Neugeborenen bis zum Tode nichts Auffallendes finden lässt. Auf die zweite Kategorie lassen sich Kósmárszky's Einwände geltend machen, dass äussere Umstände den spätern Beginn der Abnahme vom Initial-Gewicht vortäuschen können; allein es bleiben uns noch Fälle übrig, bei denen diese Irrthümer ausgeschlossen sind. Es weisen 20 Fälle statt einer Abnahme am ersten Tage sogar eine Zunahme auf, 4 Fälle eine solche, die durch Wochen hindurch als eine stetige beobachtet wurde.

Gewiss kann die Thatsache, dass 20 Kinder, d. i. 0,90% der Gesamtzahl, nicht die gewöhnliche Abnahme zeigten, noch nicht die bisherige Ansicht umstossen, dass der Gewichts-Verlust am ersten Lebenstage ein physiologischer ist, allein sie mag späteren Forschungen zum Anhalt dienen, zumal Kehrler bei seinen Thier-Versuchen die Frage, ob „das neugeborene Kind mit anderen Geschöpfen das Loos des Collapsus in den ersten Lebenstagen theilt“, verneint hat.

Bei der geringen Anzahl dieser Fälle liess sich eine Regel darüber, ob reife oder unreife Früchte, solche von multiparen oder primiparen Müttern vorzugsweise diese Ausnahme bilden nicht aufstellen.

C. Dauer der Abnahme.

Die Dauer der Abnahme wird von den Forschern in Uebereinstimmung als eine 2—3 Tage anhaltende beschrieben.

Meine Resultate sind folgende:

1 Tag	nahmen ab	446 Kinder	=	21,0 %
2 Tage	„	716	=	35,0 %
3	„	452	=	22,0 %
4	„	187	=	9,2 %
5	„	90	=	4,4 %
6	„	56	=	2,7 %
7	„	8	=	0,4 %
8	„	9	=	0,4 %
9	„	10	=	0,5 %
10	„	5	=	0,2 %

Uebertrag 1979 Kinder

11	Tage	nahmen ab	1 Kind	= 0,04 0/0
12	"	"	2 Kinder	= 0,1 0/0
13	"	"	1 Kind	= 0,04 0/0

Ohne Abnahme 49 Kinder

Summa 2 032 Kinder.

Diese Zusammenstellung führt im Ganzen zu denselben Ergebnissen, wie sie mit Ausnahme Breslau's, der den elften Tag als gewöhnlichen äussersten Termin annimmt, alle Autoren gefunden haben; ich sah nur im Gegensatz zu Altherr die Zunahme nach einem Tage fast so häufig wie am dritten Tage, so dass ich dieses Autors Angabe, die grosse Mehrzahl der Kinder nehme nur 2—3 Tage ab, dahin präcisire, dass ich die ersten drei Tage als gewöhnliche Zeit der Abnahme betrachte.

Dem Geschlechte der Neugeborenen nach fand die Abnahme in folgender Weise statt; es nahmen ab:

1	Tag	222 Knaben	(21,0 0/0)	224 Mädchen	(22,0 0/0)
2	Tage	369	(36,0 0/0)	347	(34,0 0/0)
3	"	225	(22,0 0/0)	227	(22,4 0/0)
4	"	91	(9,0 0/0)	96	(9,4 0/0)
5	"	41	(4,0 0/0)	49	(4,8 0/0)
6	"	26	(2,5 0/0)	30	(2,9 0/0)
7	"	3	(0,3 0/0)	5	(0,5 0/0)
8	"	4	(0,4 0/0)	5	(0,5 0/0)
9	"	7	(0,7 0/0)	3	(0,3 0/0)
10	"	3	(0,3 0/0)	2	(0,2 0/0)
11	"	—		1	(0,1 0/0)
12	"	—		2	(0,19 0/0)
13	"	—		1	(0,1 0/0)
Ohne Abnahme 28 Knaben				21 Mädchen	
1 019				1 013	

Hiernach nehmen in den ersten drei Tagen sowohl 79 0/0 der Knaben wie der Mädchen zu, ein Verhältniss, das fast genau mit den Resultaten Altherr's übereinstimmt.

Mit Bezug auf Primi- und Multiparität der Mütter gestalten sich die Verhältnisse so, dass abnehmen:

1 Tag	174	Kinder	Primip.	21,0 ‰	272	Kinder	Multip.	22,0 ‰
2 Tage	261	„	„	32,0 ‰	455	„	„	37,0 ‰
3 „	189	„	„	23,0 ‰	263	„	„	21,0 ‰
4 „	89	„	„	11,0 ‰	98	„	„	8,0 ‰
5 „	40	„	„	5,0 ‰	50	„	„	4,0 ‰
6 „	28	„	„	3,4 ‰	28	„	„	2,0 ‰
7 „	4	„	„	0,4 ‰	4	„	„	0,3 ‰
8 „	3	„	„	0,3 ‰	6	„	„	0,5 ‰
9 „	6	„	„	0,7 ‰	4	„	„	0,3 ‰
10 „	3	„	„	0,3 ‰	2	„	„	0,16 ‰
11 „	—	„	„	—	1	„	„	0,08 ‰
12 „	2	„	„	0,2 ‰	—	„	„	—
13 „	—	„	„	—	1	„	„	0,08 ‰
Ohne Zunahme	14	„	„	—	35	„	„	—
813				1 219				

Es nehmen also in den ersten drei Lebenstagen mehr Kinder von Multiparen ab wie von Primiparen, dagegen nehmen länger als drei Tage vorzugsweise Kinder von Primiparen ab — eine Beobachtung, die auch von anderen Forschern gemacht wurde.

Nunmehr lasse ich eine Tabelle über Dauer der Abnahme mit Berücksichtigung des Geschlechts der Neugeborenen, sowie ihres Verhältnisses als Erstgeborne oder Mehrgeborne folgen.

Von den Knaben nahmen ab:

1 Tag	Erstgeborne	85 = 20,0 0/0	Mehrgeborne	137 = 22,6 0/0
2 Tage	„	140 = 34,0 0/0	„	229 = 37,7 0/0
3 „	„	97 = 23,0 0/0	„	128 = 21,0 0/0
4 „	„	42 = 10,0 0/0	„	49 = 6,0 0/0
5 „	„	20 = 4,8 0/0	„	21 = 3,4 0/0
6 „	„	13 = 3,0 0/0	„	13 = 2,1 0/0
7 „	„	1 = 0,2 0/0	„	2 = 0,3 0/0
8 „	„	1 = 0,2 0/0	„	3 = 8,49 0/0
9 „	„	4 = 0,9 0/0	„	3 = 0,49 0/0
10 „	„	3 = 0,7 0/0	„	—
Ohne Zunahme	„	7	„	21
		413		606

Wir sehen somit, dass bei den Knaben Multiparer in den ersten drei Tagen eine grössere Abnahme stattfindet, wie bei den Knaben Primiparer, letztere dagegen in späterer Zeit überwiegen.

Bei den Mädchen ergibt sich folgendes Verhältniss:

Es nahmen ab:

1 Tag	Erstgeborne	89 = 22,0 0/0	Mehrgeborne	135 = 22,0 0/0
2 Tage	"	121 = 30,0 0/0	"	226 = 36,6 0/0
3	"	92 = 24,0 0/0	"	135 = 22,0 0/0
4	"	47 = 11,6 0/0	"	49 = 7,9 0/0
5	"	20 = 5,0 0/0	"	29 = 4,7 0/0
6	"	15 = 3,7 0/0	"	15 = 2,4 0/0
7	"	3 = 0,75 0/0	"	2 = 0,3 0/0
8	"	2 = 0,5 0/0	"	3 = 0,48 0/0
9	"	2 = 0,5 0/0	"	1 = 0,16 0/0
10	"	—	"	2 = 0,3 0/0
11	"	—	"	1 = 0,16 0/0
12	"	2 = 0,5 0/0	"	—
13	"	—	"	1 = 0,16 0/0
Ohne Zunahme	"	7	"	14
		400	613	

Auch bei den Mädchen sehen wir also in den ersten drei Tagen Neugeborne Multiparer in der Abnahme überwiegen, später jedoch die Mädchen Primiparer.

Schliesslich folge nun noch eine tabellarische Uebersicht darüber, wie sich vollständig ausgetragene Kinder gegen nicht reife Neugeborne in der Dauer der Abnahme verhielten.

Es nahmen ab:

1 Tag	reife Kinder	330 = 23,0 0/0	nicht reife	116 = 18,0 0/0
2 Tage	"	528 = 36,0 0/0	"	188 = 32,0 0/0
3	"	315 = 21,7 0/0	"	137 = 23,4 0/0
4	"	125 = 8,6 0/0	"	62 = 10,6 0/0
5	"	60 = 4,1 0/0	"	30 = 5,1 0/0
6	"	38 = 2,6 0/0	"	18 = 3,0 0/0
7	"	4 = 0,27 0/0	"	4 = 0,7 0/0
8	"	4 = 0,27 0/0	"	5 = 0,86 0/0
		1404	560	

Uebertrag: reife Kinder 1404			nicht reife 560		
9 Tage	„	7 = 0,48 0/0	„	3 = 0,5 0/0	
10 „	„	3 = 0,2 0/0	„	2 = 0,34 0/0	
11 „	„	1 = 0,07 0/0	„	—	
12 „	„	—	„	2 = 0,34 0/0	
13 „	„	1 = 0,07 0/0	„	—	
ohne Abnahme	„	32		17	
1448			584		

Nach dieser Zusammenstellung müssen auch hier wir als gewöhnlichen Wendepunkt den dritten Tag annehmen, an dem die Zunahme für die Mehrzahl der Kinder beginnt. Reife Kinder jedoch zeigen entschieden grössere Neigung, nach den ersten zwei Lebenstagen mit der Zunahme zu beginnen, als unreife, während am dritten Tage die Procentzahl reifer und unreifer Neugeborner, die die Abnahme beendet hatten, eine nahezu gleiche ist; in späteren Lebenstagen beenden dann vorzugsweise unreife Früchte ihre Abnahme.

Fassen wir noch einmal den Inhalt unserer Tabellen kurz zusammen, so enthalten sie Folgendes:

Am ersten Tage schon hatten Knaben und Mädchen primiparer und multiparer Mütter in fast gleicher Procentzahl ihre Abnahme beendet, nämlich 22 0/0 aller Kinder, wobei nur die Knaben Primiparer um 2 0/0 zurückbleiben.

Von den reifen Früchten nahmen 3 0/0 bis zu diesem Tage ab, während 18 0/0 unreifer Früchte schon nach einem Tage wieder zunahmen.

Am zweiten Tage hatten die Abnahme beendet:

- 54 0/0 Knaben Primiparer,
- 58,7 0/0 Knaben Multiparer,
- 52 0/0 Mädchen Primiparer,
- 58,6 0/0 Mädchen Multiparer.
- 59 0/0 der reifen Neugeborenen,
- 49 0/0 der nicht reifen Neugeborenen.

Am dritten Tage haben ihre Abnahme beendet:

- 77 0/0 Knaben Primiparer,
- 80 0/0 Knaben Multiparer,

76 0/0 Mädchen Primiparer,

80 0/0 Mädchen Multiparer.

80 0/0 der reifen Neugeborenen,

73 0/0 der nicht reifen Neugeborenen.

Am vierten Tage hatten ihre Abnahme beendet:

87 0/0 Knaben Primiparer,

87 0/0 Knaben Multiparer,

88 0/0 Mädchen Primiparer,

88 0/0 Mädchen Multiparer.

89 0/0 der reifen Kinder,

84 0/0 der nicht reifen Kinder.

Es lassen sich aus diesen Zusammenstellungen folgende Schlüsse ziehen:

1. Die grosse Mehrzahl aller Neugeborenen hat in den ersten drei Tagen die Abnahme vollendet. (79 0/0 der Kinder.)

2. Am zweiten und dritten Tage vollendet eine grössere Zahl von Kindern Multiparer ihre Abnahme als Kinder Primiparer; am vierten Tage stehen beide einander gleich.

3. Ein Einfluss des Geschlechts auf frühere oder spätere Zunahme lässt sich nicht constatiren; Kézmárszky's und Haake's Behauptung, Knaben beginnen früher zuzunehmen, lässt sich nicht aufrecht erhalten.

4. Reife Kinder zeigen mehr Neigung, nach den ersten Lebenstagen ihre Zunahme zu beginnen als nicht reife.

D. Summe der Abnahme.

Die Angaben über die durchschnittliche Gewichts-Abnahme, die im Ganzen das neugeborene Kind erleidet, sind nicht bei allen Forschern übereinstimmend: während Bouchaud dieses Gewicht auf 100 gr festsetzt, fand Winckel 200 gr Abnahme im Durchschnitt, womit auch Gregory's und Kézmárszky's Berechnungen übereinstimmen. Ebenso constatirte Altherr für die Mehrzahl der Neugeborenen im Baseler Spital eine durchschnittliche Abnahme von 100—300 gr.

Nach meinen Ermittlungen gestalten sich die Verhältnisse in folgender Weise:

1—100 gr	nahmen ab	134	Kinder	6,5 ‰
100—200 gr	„	658	„	32,8 ‰
200—300 gr	„	762	„	38 ‰
300—400 gr	„	322	„	15,8 ‰
400—500 gr	„	72	„	3,5 ‰
500—600 gr	„	21	„	0,9 ‰
600—700 gr	„	12	„	0,5 ‰
800 gr	„	2	„	0,09 ‰
Gar nicht	„	49	„	

2 032 Kinder.

Demnach nimmt fast 94 ‰ aller Kinder zwischen 1—400 gr ab, eine grössere Abnahme gehört zu den Seltenheiten; über 60 ‰ aller Kinder zeigten eine Abnahme von 100—300 gr, so dass meine Berechnungen mit andern Autoren, — Bouchaud ausgenommen — speziell aber mit Altherr, übereinstimmen.

Mit Berücksichtigung des Geschlechts wird die Tabelle lauten:

Es nahmen ab

1—100 gr	Knaben	67 = 6,5 ‰	Mädchen	67 = 6,6 ‰
100—200 gr	„	317 = 31,0 ‰	„	341 = 33,6 ‰
200—300 gr	„	392 = 38,4 ‰	„	370 = 36,3 ‰
300—400 gr	„	165 = 16,1 ‰	„	157 = 15,4 ‰
400—500 gr	„	34 = 3,3 ‰	„	38 = 3,7 ‰
500—600 gr	„	11 = 1,0 ‰	„	10 = 0,9 ‰
600—700 gr	„	4 = 0,35 ‰	„	8 = 0,7 ‰
800 gr	„	1 = 0,09 ‰	„	1 = 0,09 ‰
Gar nicht	„	28 —	„	21 —
		1 019.		1 013.

Ein Einfluss des Geschlechts auf die Grösse der Abnahme lässt sich hiernach nicht constatiren, ebenso wenig fand ich, wie Altherr es that, abnorm grosse Abnahmen mehr bei Knaben wie bei Mädchen.

In welchem Verhältniss Primi- resp. Multiparität der Mutter zur Höhe der Abnahme steht, zeigt sich in folgenden Tabellen:

Es nahmen ab unter den Knaben:

1—100 gr	Knaben Primip.	26 = 6,3 0/0	Knaben Multip.	41 = 6,7 0/0
100—200 gr	„	124 = 30,3 0/0	„	193 = 31,5 0/0
200—300 gr	„	168 = 41,2 0/0	„	224 = 36,6 0/0
300—400 gr	„	62 = 15,1 0/0	„	103 = 16,8 0/0
400—500 gr	„	13 = 3,1 0/0	„	21 = 3,4 0/0
500—600 gr	„	7 = 1,7 0/0	„	4 = 0,6 0/0
600—700 gr	„	2 = 0,4 0/0	„	2 = 0,3 0/0
800 gr	„	—	„	1 = 0,16 0/0
Gar nicht	„	6	„	22
		408.		611.

Es nahmen ab unter den Mädchen:

1—100 gr Mädchen Multip.	23 = 5,6 0/0	Mädchen Primip.	44 = 7,2 0/0
100—200 gr „	142 = 35,0 0/0	„	199 = 32,7 0/0
200—300 gr „	157 = 38,7 0/0	„	213 = 35,0 0/0
300—400 gr „	56 = 13,8 0/0	„	101 = 16,6 0/0
400—500 gr „	16 = 3,9 0/0	„	22 = 3,6 0/0
500—600 gr „	2 = 0,45 0/0	„	8 = 1,3 0/0
800 gr „	— —	„	1 —
Gar nicht „	7 —	„	14 —
	405.		608.

Die normale Abnahme von 100—300 gr bewahrten hiernach:

71,5 0/0 Knaben primiparer Mütter,
 68,0 0/0 Knaben multiparer Mütter,
 73,7 0/0 Mädchen primiparer Mütter,
 67,7 0/0 Mädchen multiparer Mütter.

Somit verhalten sich Knaben und Mädchen wiederum fast gleich, dagegen übertrifft die Zahl Neugeborner von Primiparen, die Normal-Abnahmssumme aufweisen, jene von Multiparen. Eine Neigung von Kindern Primiparer, in grösserem Umfang abzunehmen als Kinder Multiparer, wie sie Altherr zu bemerken glaubte, lässt sich nicht nachweisen.

Was nun den Unterschied in der Abnahms-Summe reifer oder unreifer Kinder betrifft, so liess sich auffallender Weise

keinerlei Gesetz darüber aufstellen, ob reife Kinder die normale Abnahme häufiger zeigen, wie nicht ausgetragene.

Unsere Tabelle lautet:

Es zeigten eine Abnahme von

1—100 gr reife Kinder	93 = 6,4 0/0	nicht reife	41 = 7,0 0/0
100—200 gr " "	441 = 30,4 0/0	" "	217 = 37,0 0/0
200—300 gr " "	541 = 37,3 0/0	" "	221 = 37,9 0/0
300—400 gr " "	268 = 18,3 0/0	" "	54 = 9,2 0/0
400—500 gr " "	50 = 3,4 0/0	" "	22 = 3,7 0/0
500—600 gr " "	12 = 0,8 0/0	" "	9 = 1,5 0/0
600—700 gr " "	9 = 0,6 0/0	" "	3 = 0,5 0/0
800 gr " "	2 = 0,1 0/0	" "	—
Gar keine " "	32	" "	17

1 448 Kinder

584 Kinder.

Danach stellen die nicht reifen Kinder einen grösseren Procentsatz für die Zahl derer, die die normale Abnahme von 100 bis 300 gr aufweisen und erst bei der Abnahme von 300—400 gr wird das Verhältniss der reifen und nicht reifen Kinder ausgeglichen. Nur bei den höchsten Abnahms-Summen finden sich verhältnissmässig mehr nicht reife Kinder.

Alles in Allem lassen sich aus dem Vorstehenden folgende Sätze aufstellen:

1. Die normale Abnahmssumme der Neugeborenen beträgt 100—300 gr.

2. Ein Abweichen von der Norm wird weder durch das Geschlecht bedingt, noch dadurch, dass das Kind ausgetragen ist oder nicht.

3. Früchte primiparer Mütter zeigen im Durchschnitt eine geringere Abnahmssumme als solche multiparer Mütter.

E. Das Erreichen des Initial-Gewichts.

Während über die Körpergewichts-Veränderungen der Neugeborenen in den meisten Punkten die Ansicht der Geburtshelfer wenigstens einigermaßen übereinstimmend ist, wird der Zeitpunkt, an dem das Gewicht der Neugeborenen wieder die Höhe

des Initial-Gewichts erreicht hat, in durchaus differirender Weise von den Forschern angegeben.

Wir finden darüber folgende Angaben:

Als Zeitpunkt des erreichten Initial-Gewichts setzten fest

Hofmann den fünften bis sechsten Tag,

Bouchaud den vierten bis siebenten Tag,

Gregory den siebenten Tag,

Haake den neunten Tag,

Winckel den zehnten Tag,

Késmárszky etwa den siebenten Tag.

Wenn wir nun bei unserm Material den Zeitpunkt des erreichten Initial-Gewichts festsetzen, so muss ich zunächst vorausschicken, dass die Zahl der Kinder, die uns für diese Bestimmung zur Verfügung steht, bedeutend zusammenschrumpft, da der Spital-Aufenthalt der Neugeborenen in Basel — wie bereits oben bemerkt — an Dauer abgenommen hat, nicht mehr wie zur Zeit der Altherr'schen Beobachtungen eine regelmässige 14tägige Dauer erreicht. Eine grosse Anzahl von Kindern verliess das Spital bei stetig zunehmendem Gewicht schon nach einer Woche und entzog sich somit der Beobachtung.

Immerhin erreichten das Initial-Gewicht von den im Spital gewogenen Kindern:

901 Kinder = 44,35 0/0,

wogegen 1 131 Kinder = 55,65 0/0

das Spital verliessen ohne Erreichung des Initial-Gewichts.

Unter den Kindern, die das Initial-Gewicht während des Spital-Aufenthalts erreicht hatten, befanden sich:

505 Knaben = 49,5 0/0 der Gesamtzahl,

396 Mädchen = 39,0 0/0 „ „

901 Kinder.

Dagegen erreichten das Initial-Gewicht nicht:

514 Knaben = 50,4 0/0

617 Mädchen = 60,9 0/0

1 131.

Es ist bemerkenswerth, dass nur 44 0/0 aller Kinder nach erreichtem Initial-Gewicht das Spital verliessen, dass unter dieser Anzahl die Knaben ein weit günstigeres Resultat aufweisen wie die Mädchen, da nahezu die Hälfte aller Knaben in der gleichen Zeit ihr ursprüngliches Gewicht erlangten, in der nur 39 0/0 der Mädchen dies Ziel erreichten.

Das Geschlecht, die Primi- resp. Multiparität der Mutter berücksichtigen wir in den folgenden Zusammenstellungen:

Es haben das Initial-Gewicht erreicht

184 Knaben Primiparer = 44,5 0/0 (von 413 Knaben)

321 Knaben Multiparer = 52,9 0/0 (von 606 Knaben)

162 Mädchen Primiparer = 40,5 0/0 (von 400 Mädchen)

234 Mädchen Multiparer = 38,1 0/0 (von 613 Mädchen).

Dagegen nicht erreicht:

229 Knaben Primiparer = 55,4 0/0

285 Knaben Multiparer = 47,0 0/0

238 Mädchen Primiparer = 59,5 0/0

379 Mädchen Multiparer = 61,9 0/0.

Somit erreichen in gleichem Zeitraum eine weit grössere Anzahl von Knaben als Mädchen das Initial-Gewicht und unter den Knaben wiederum liegen die Verhältnisse für Kinder Multiparer weit günstiger. Dagegen bleiben Mädchen multiparer Mütter nicht allein gegenüber den Knaben Multiparer (38,1 0/0 : 52,9 0/0), sondern auch gegenüber den Mädchen Primiparer weit zurück (38,1 0/0 : 40,5 0/0), ein Umstand so auffallender Art, dass ich nicht auf dieses Ergebniss hin ein Gesetz aufbauen möchte.

Dagegen lassen sich aus den vorstehenden Tafeln die von Késmárszky und Altherr aufgestellten Sätze, betreffs des energischeren Stoffwechsels bei Knaben, recht wohl aufrecht erhalten. Zwar konnte ich, wie bereits erwähnt, nicht wie jene Autoren eine frühere Zunahme bei Knaben beobachten, es erreichten aber auch nach meinen Zusammenstellungen Neugeborene männlichen Geschlechts trotz ihres durchschnittlich grössern Initial-Gewichts dasselbe dennoch rascher wieder, wie Früchte weiblichen Geschlechts.

Ueber den Zeitpunkt, an dem das Initial-Gewicht erreicht wird, liess sich Folgendes bei den 901 Kindern ermitteln. Das Initial-Gewicht erreichten:

am	2. Tage	16 Kinder	=	1,7 ‰
„	3. „	34 „	=	3,7 ‰
„	4. „	87 „	=	9,6 ‰
„	5. „	99 „	=	10,8 ‰
„	6. „	113 „	=	12,6 ‰
„	7. „	100 „	=	11,1 ‰
„	8. „	89 „	=	8,9 ‰
„	9. „	83 „	=	9,2 ‰
„	10. „	51 „	=	5,6 ‰
„	11. „	52 „	=	5,7 ‰
„	12. „	48 „	=	5,3 ‰
„	13. „	42 „	=	4,6 ‰
„	14. „	34 „	=	3,7 ‰
„	15. „	26 „	=	2,8 ‰
„	16. „	7 „	=	0,7 ‰
„	17. „	5 „	=	0,5 ‰
„	18. „	1 „	=	0,1 ‰
„	19. „	5 „	=	0,5 ‰
„	20. „	2 „	=	0,2 ‰
„	21. „	3 „	=	0,3 ‰
„	23. „	1 „	=	0,1 ‰
„	24. „	1 „	=	0,1 ‰
„	26. „	1 „	=	0,1 ‰
„	30. „	1 „	=	0,1 ‰

Summa 901 Kinder.

Berechnen wir nach unsern Tabellen, wie viele Kinder an den von früheren Autoren angegebenen Terminen das Initial-Gewicht erreichten, so finden wir Folgendes:

Am siebenten Tage (Angabe von Bouchaud, Gregory, Kézmárszky) hatten dasselbe Gewicht wie bei der Geburt:

449 Kinder = 49,8 ‰;

am neunten Tage (Angabe von Haake):

621 Kinder = 68,8 ‰;

am zehnten Tage (Angabe von Winckel):

$$672 \text{ Kinder} = 74,0 \text{ ‰}$$

Es haben an allen diesen Terminen — nach unsern Erfahrungen — die Gesamtzahl der Kinder noch nicht ihr Anfangsgewicht erreicht, obwohl auch aus unsern Tabellen ersichtlich ist, dass der siebente Tag als ein entschieden wichtiger dasteht, da an ihm fast 50 ‰ der Kinder ihr Anfangsgewicht erlangt, haben und von da an die Zahl der Kinder, pro Tag berechnet, wesentlich abnimmt.

Immerhin aber bin ich geneigt, erst den 15. Lebenstag als Termin anzunehmen, zumal da auch Altherr's Forschungen hierin mit den meinen völlig übereinstimmen.

Die Zahl von Kindern von gleichem Gewicht wie an ihrem Geburtstage beträgt am 15. Lebenstage:

$$874 = 97,0 \text{ ‰}$$

Bei diesem hohen Procentsatz darf man, meine ich, den kleinen Rest der Kinder, die für den 15. bis 30. Tag angeführt sind, als seltene Ausnahme betrachten und ich zögere nicht, den 15. Tag als normalen Termin aufzustellen, um so mehr, da auch nach diesem Tage — wie wir es nach dem siebenten Tage sahen — pro Tag berechnet die Zahl der Kinder wiederum bedeutend abnimmt.

Für jenen von den meisten Autoren und für den von uns gefundenen Termin ergeben sich nun folgende speziellere Daten; es erreichten das Initial-Gewicht innerhalb sieben Tagen:

$$257 \text{ Knaben} = 50,6 \text{ ‰}$$

$$192 \text{ Mädchen} = 46,0 \text{ ‰}$$

$$449;$$

innerhalb 15 Tagen:

$$492 \text{ Knaben} = 97,4 \text{ ‰}$$

$$382 \text{ Mädchen} = 96,4 \text{ ‰}$$

$$874.$$

Betreffs der Primi- resp. Multiparität der Mütter ergibt sich dass das Initial-Gewicht erreichten in den ersten sieben Tagen:

Knaben	von Primiparen	90 = 49,0 0/0
„	„ Multiparen	167 = 52,0 0/0
Mädchen	„ Primiparen	69 = 42,0 0/0
„	„ Multiparen	123 = 52,5 0/0
		449;

in den 15 ersten Tagen:

Knaben	von Primiparen	180 = 98,0 0/0
„	„ Multiparen	312 = 97,2 0/0
Mädchen	„ Primiparen	159 = 98,0 0/0
„	„ Multiparen	223 = 95,3 0/0
		874.

Knaben und Mädchen erreichten somit während des gewöhnlichen Spital-Aufenthaltes in fast gleicher Procentzahl das Initial-Gewicht, jedoch machte sich in den ersten sieben Tagen ein Ueberwiegen der Knaben bemerkbar. In dieser Zeit lieferten auch die Kinder Multiparer einen bedeutend grösseren Procentsatz für die Zahl der Kinder, die das Anfangs-Gewicht erreichten, als die Früchte Primiparer, ein Verhältniss, das sich nach der zweiten Lebenswoche gerade umgekehrt gestaltet.

Zusammengefasst ergiebt die Statistik über das Erreichen des Initial-Gewichts Folgendes:

1. In der gleichen Zeit erlangen das Initial-Gewicht eine bedeutend grössere Anzahl von Knaben als von Mädchen, von Knaben Multiparer als von solchen Primiparer.

2. Am siebenten Tage haben die Hälfte der Kinder ihr Initial-Gewicht erreicht,¹⁾ nach dem 15. Tage ist nur ausnahmsweise das Initial-Gewicht noch nicht erreicht.

3. Eine grössere Anzahl von Knaben als von Mädchen zeigen in beiden ersten Lebenswochen ihr Initial-Gewicht; Kinder multiparer Mütter erreichen dasselbe vorwiegend in der ersten, Kinder primiparer vorwiegend in der zweiten Lebenswoche.

¹⁾ Kézmárszky giebt zu — obwohl er den siebenten Tag als Termin für die Zunahme nennt — „dass bis zum siebenten Tag kaum etwas mehr als die Hälfte des erlittenen Verlustes gedeckt wird“.

F. Approximative tägliche Zunahme.

In diesem Abschnitt wird die Zahl der Kinder, die wir zur Statistik verwenden, nicht unwesentlich dadurch verkleinert, dass eine ziemlich bedeutende Menge der Neugeborenen von dem bereits erreichten Initial-Gewicht während des Spital-Aufenthalts wieder abnahm und somit wirkliche Zunahme beim Austritt nicht aufwies.

Von den 901 Kindern verloren an dem erreichten Gewicht wiederum 188 Kinder; es bleiben somit

$$713 \text{ Kinder} = 35,0 \text{ ‰}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{darunter } 397 \text{ Knaben} & = & 55,6 \text{ ‰} \\ & & 316 \text{ Mädchen} = 44,3 \text{ ‰} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 397 \\ 316 \end{array}} \right\} \text{dieser Kinder,}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{oder } 397 \text{ Knaben} & = & 38,9 \text{ ‰} \\ & & 316 \text{ Mädchen} = 31,0 \text{ ‰} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 397 \\ 316 \end{array}} \right\} \text{der Gesamtzahl.}$$

Mit definitiver Zunahme verliessen also bedeutend mehr Knaben wie Mädchen das Spital.

Geschlecht der Kinder sowie Primi- resp. Multiparität der Mütter verhielten sich in der Weise, dass eine Zunahme bei ihrem Austritt zeigten:

$$\begin{array}{lcl} \text{Knaben von Primiparen} & 137 & = 33,1 \text{ ‰} \\ \text{„ „ Multiparen} & 260 & = 42,9 \text{ ‰} \\ \text{Mädchen von Primiparen} & 127 & = 31,7 \text{ ‰} \\ \text{„ „ Multiparen} & 189 & = 30,8 \text{ ‰} \end{array}$$

713.

Diese Zusammenstellung ergibt für die Knaben, unter diesen wiederum für die Knaben multiparer Mütter die günstigsten Verhältnisse, während bei den Mädchen sich eine geringe Differenz zu Ungunsten der Kinder von Multiparen ergab.

Zur Vervollständigung mögen hier noch die Verhältnisse der Neugeborenen erläutert werden, die bei ihrem Austritt keine Zunahme aufwiesen. Ihre Anzahl beträgt

1 319 Kinder,

die sich nach dem Geschlecht, nach Primiparität resp. Multiparität in folgender Weise vertheilen:

Knaben	622	=	61,4 0/0
Mädchen	697	=	68,8 0/0
	<u>1 319,</u>		

darunter:

276	Knaben	Primiparer	=	66,8 0/0
346	„	Multiparer	=	57,1 0/0
273	Mädchen	Primiparer	=	68,2 0/0
424	„	Multiparer	=	69,2 0/0
<u>1 319</u>	Kinder.			

Die Resultate dieser Tabellen zeigen in Uebereinstimmung mit den vorherigen Erörterungen einen geringeren Procentsatz für die Knaben, speziell für die Knaben multiparer Mütter.

Es scheint mir interessant, hier noch hinzuzufügen, wie sich das Verhältniss der ausgetragenen zu den nicht vollständig ausgetragenen Früchten gestaltet unter denjenigen, die bei ihrem Austritt Initial-Gewicht oder eine Zunahme desselben zeigten.

Unter den 713 Kindern befanden sich:

518 vollständig ausgetragene Früchte,

175 nicht vollständig ausgetragene Früchte,

ein Verhältniss, das in Procenten ausgedrückt:

$$75,4 \text{ 0/0} : 24,5 \text{ 0/0}$$

ergiebt.

Für die Neugeborenen unserer Statistik findet sich Folgendes: Es verliessen mit dem Initial-Gewicht oder schwerer das Spital

von 1 448 reifen Kindern	538 = 49,2 0/0
von 584 nicht reifen Kindern	<u>175 = 29,2 0/0</u>
	713,

eine Differenz, die die alte Erfahrung auf das Beste erläutert, dass ein reifes Kind zur Erfüllung der Lebens-Bedingungen in den ersten Wochen weit geeigneter erscheint, als ein nicht reifes.

Bei den erwähnten 713 Kindern nun liess sich (nach dem Vorgange Altherr's) die tägliche approximative Zunahme in der Weise berechnen, dass das Initial-Gewicht vom Austritts-Gewicht subtrahirt, die resultirende Summe durch die Anzahl der Verpflegungstage dividirt wurde.

Dabei ist zu bemerken, dass eine nicht geringe Anzahl von Neugeborenen in diese Rubrik mit aufgenommen wurde, die genau dasselbe Gewicht beim Austritt wie bei ihrer Geburt aufweisen.

Es zeigten eine tägliche Zunahme von:

1— 5 gr	231	Kinder	=	32,4 0/0
6—10 gr	158	„	=	22,1 0/0
11—15 gr	104	„	=	14,5 0/0
16—20 gr	53	„	=	7,4 0/0
21—25 gr	30	„	=	4,2 0/0
26—30 gr	13	„	=	1,8 0/0
31—35 gr	7	„	=	0,9 0/0
36—40 gr	1	„	=	0,1 0/0
41—45 gr	1	„	=	0,1 0/0
46—50 gr	2	„	=	0,2 0/0
60 gr	2	„	=	0,2 0/0
Initial-Gewicht zeigten	111	„	=	15,5 0/0

713 Kinder.

Somit weisen über die Hälfte der Kinder (54,5 0/0) nur eine tägliche Zunahme von weniger als 10 gr auf, über 20 gr täglicher Zunahme zeigt sich bei weniger als einem Drittel der Neugeborenen — Resultate, die nahezu mit den Angaben Altherr's übereinstimmen, der nur bei höheren Gewichts-Zunahmen eine grössere Procentzahl fand wie ich. Daher mag er auch die Zunahme von 30—40 gr als die normale ansehen; mir scheint sie entschieden zu hoch gegriffen, da in meinen Tabellen nur 1 0/0 von 713 Kindern dieses Wachstums-Maximum erreichte.

Berechne ich die Summe, die 602 Kinder (nämlich 713 minus 111 Kinder, die nur das Initial-Gewicht erreichten) während des Spital-Aufenthaltes zunahmen, so finde ich 5832 gr., für jedes einzelne Kind also nicht ganz 10 gr. Dass dieses Resultat nicht mit Bouchaud's und Odier's Angaben übereinstimmt, die 20 bis 35 gr tägliche Zunahme berechnen, kann meine Behauptung nicht umstossen, dass unter gewöhnlichen Lebensbedingungen, wie sie das Spital bietet, die Höhe der täglichen Zunahme nicht das Gewicht von 10 gr übersteigt.

Wie wir bereits sahen, erlebten nur 175 nicht vollständig ausgetragene Kinder das Erreichen des Initial-Gewichtes oder eine Zunahme darüber im Hospital. Wie diese Anzahl nun zu der täglichen Zunahme der reifen Kinder sich verhielt, zeigt folgende Vergleichung:

1—5 gr	231 Kind.	=	168 reife (23,5 0/0)	63 nicht reife (8,8 0/0)
6—10 gr	158 „	=	118 „ (16,5 0/0)	40 „ „ (5,6 0/0)
11—15 gr	104 „	=	79 „ (11,0 0/0)	25 „ „ (3,5 0/0)
16—20 gr	53 „	=	40 „ (5,6 0/0)	13 „ „ (1,8 0/0)
21—25 gr	30 „	=	23 „ (3,2 0/0)	7 „ „ (0,9 0/0)
26—30 gr	13 „	=	11 „ (1,5 0/0)	2 „ „ (0,2 0/0)
31—35 gr	7 „	=	7 „ (0,9 0/0)	— „ „ —
36—40 gr	1 „	=	1 „ (0,1 0/0)	— „ „ —
41—45 gr	2 „	=	2 „ (0,2 0/0)	— „ „ —
46—50 gr	2 „	=	2 „ (0,2 0/0)	— „ „ —
60 gr	2 „	=	2 „ (0,2 0/0)	— „ „ —
Init.-Gew.	111 „	=	86 „ (12,0 0/0)	25 „ „ (3,5 0/0)
713 Kind. =			538 reife	175 nicht reife.

Danach erlangte kein einziges unvollständig ausgetragenes Kind eine Durchschnittszunahme von mehr als 30 gr, es zeigten sich vielmehr unter den wenig zunehmenden Neugeborenen eine verhältnissmässig grosse Anzahl von nicht reifen Kindern. Es ist interessant, wie in obiger Tabelle der Procentsatz der nicht reifen Kinder fast stetig mit jeder Rubrik abnimmt, die eine höhere Durchschnittszunahme der Kinder überhaupt darstellt.

Wir beobachten eine Zunahme von

1—15 gr bei 68,0 0/0	Kindern der reifen Neugeborenen
73,0 0/0	„ der nicht reifen Neugeborenen
15—30 gr bei 13,7 0/0	Kindern der reifen Neugeborenen
11,4 0/0	„ der nicht reifen Neugeborenen.

Bei den Neugeborenen ohne Zu- und Abnahme waren

15,9 0/0	der reifen Früchte
14,2 0/0	der nicht reifen Früchte.

Es ist somit klar, dass nicht nur die nicht reifen in geringerer Anzahl wie die reifen Kinder das Initial-Gewicht er-

reichten, sondern auch dass sie bei wirklicher Zunahme weit geringere Durchschnittszunahme pro Tag aufweisen, wie vollständig reife Kinder.

Von dem Einflusse des Geschlechts der Neugeborenen und der Primi- resp. Multiparität der Mutter geben uns die folgenden Zusammenstellungen Auskunft.

Es zeigen eine tägliche Zunahme von

		Knaben:		Mädchen	
67,6 ‰	der Knaben:	1—5 gr	119 = 29,9 ‰	112 = 35,4 ‰	
65,5 ‰	der Mädchen	6—10 gr	96 = 24,1 ‰	62 = 14,6 ‰	
		11—15 gr	54 = 13,6 ‰	49 = 15,5 ‰	
15,5 ‰	der Knaben:	16—20 gr	28 = 7,0 ‰	24 = 7,5 ‰	
11,5 ‰	der Mädchen	21—25 gr	26 = 6,5 ‰	10 = 3,1 ‰	
		26—30 gr	8 = 2,0 ‰	3 = 0,9 ‰	
		31—35 gr	5 = 1,2 ‰	2 = 0,6 ‰	
		36—40 gr	1 = 0,3 ‰	—	—
		41—45 gr	1 = 0,3 ‰	—	—
		46—50 gr	1 = 0,3 ‰	1 = 0,3 ‰	
		60 gr	1 = 0,3 ‰	1 = 0,3 ‰	
		Initial-Gewicht	57 = 14,3 ‰	52 = 16,4 ‰	
			397	316	

Es nahmen zu die Knaben

		v. Primip.		v. Multip.	
64,8 ‰	der Primip.:	1—5 gr	41 = 29,9 ‰	78 = 30,0 ‰	
68,9 ‰	der Multip.	6—10 gr	29 = 21,1 ‰	67 = 25,5 ‰	
		11—15 gr	19 = 13,8 ‰	35 = 13,4 ‰	
13,7 ‰	der Primip.:	16—20 gr	9 = 6,5 ‰	19 = 7,3 ‰	
16,5 ‰	der Multip.	21—25 gr	8 = 5,8 ‰	18 = 6,9 ‰	
		26—30 gr	2 = 1,4 ‰	6 = 2,3 ‰	
		31—35 gr	2 = 1,4 ‰	3 = 1,1 ‰	
		36—40 gr	—	1 = 0,3 ‰	
		41—45 gr	—	1 = 0,3 ‰	
		46—50 gr	—	1 = 0,3 ‰	
		60 gr	1 = 0,7 ‰	—	—
		Initial-Gewicht	26 = 18,9 ‰	31 = 11,9 ‰	
			137	260	

Es nahmen zu die Mädchen

	v. Primip.	v. Multip.
72,4 0/0 der Primip.:	1—5 gr 46 = 36,2 0/0	66 = 34,8 0/0
69,3 0/0 der Multip.:	6—10 gr 30 = 23,6 0/0	32 = 16,9 0/0
	11—15 gr 16 = 12,6 0/0	33 = 17,6 0/0
8,6 0/0 der Primip.:	16—20 gr 8 = 6,3 0/0	16 = 8,4 0/0
13,6 0/0 der Multip.:	21—25 gr 2 = 1,6 0/0	8 = 4,2 0/0
	26—30 gr 1 = 0,7 0/0	2 = 1,0 0/0
	31—35 gr 2 = 1,6 0/0	— —
	45—50 gr — —	1 = 0,5 0/0
	60 gr 1 = 0,7 0/0	— —
Initial-Gewicht	21 = 16,5 0/0	31 = 16,4 0/0
	127	189.

Wir sehen somit bei den Kindern, die nur das Initial-Gewicht erreichten, nicht dasselbe überschritten, ein Ueberwiegen der Mädchen gegenüber den Knaben.

Zwischen 1—15 gr nahm der Procentzahl nach fast eine gleiche Anzahl von Neugeborenen männlichen und weiblichen Geschlechts zu (67,6 0/0 der Knaben : 65,5 0/0 der Mädchen), zwischen 16—30 gr ist bereits bedeutendes Vorwiegen der Knaben zu constatiren, bis schliesslich die grössten täglichen Zunahmen fast ausnahmslos den Knaben zukommen.

Nur einzig und allein sehen wir zwischen 1—15 gr. eine höhere Procentzahl von Mädchen Primiparer verzeichnet, sonst zeigen überall die Kinder Multiparer günstigere Verhältnisse.

Die Resultate unserer Forschungen über approximative tägliche Zunahme fassen wir zusammen in den Sätzen:

1. Bei gleichem Aufenthalt im Spital zeigen mehr Knaben wie Mädchen Zunahme, ebenso Kinder multiparer Mütter und solche, die vollständig ausgetragen sind, als Kinder Primiparer und nicht vollständig reife Neugeborene.

2. Die gewöhnliche tägliche Zunahme des Gewichts beziffert sich auf 10 gr.

3. Reife Kinder, Knaben und Neugeborene von Multiparen zeigen grössere tägliche Zunahmen wie nicht reife Kinder, Mädchen und Neugeborene von Primiparen.

Anhang.

Nachdem im Vorstehenden die Thatsache der Gewichts-Veränderung Neugeborner nach allen Richtungen hin erörtert ist, sei es mir erlaubt, über die Ursachen dieser Veränderungen einige statistische Notizen hinzuzufügen, zumal ich in der Literatur statistische Nachweise über Einflüsse auf das Wachsthum des neugebornen Kindes nur spärlich vorfinde.

Allein Altherr veröffentlichte ausgiebige statistische Angaben über Zunahme des Kindes bei Krankheit der Mutter und Vergleichen der Zunahme bei verschiedener Ernährung des Kindes. Um so mehr werde ich auch im Folgenden der Eintheilung jenes Forschers folgen und glaube durch Nebeneinanderstellen der beiden Tabellen wesentliche Vorthelle zu gewinnen.

A. Krankheit der Mutter.

Unter den 713 Kindern, die beim Austritt aus dem Hospital eine thatsächliche Zunahme aufwiesen und deren tägliche approximative Zunahme vorher besprochen wurde, befanden sich:

480 Kinder, deren Mütter gesund waren,

233 Kinder, deren Mütter während der Geburt oder im Beginn des Wochenbetts erkrankten,

713;

in Procenten ausgedrückt:

bei 67,3 % der Kinder verhielten die Mütter sich normal,

bei 32,6 % der Kinder erkrankten die Mütter.

Es kommen nun 111 dieser Kinder, die — wie früher erwähnt — beim Austritt weder Zunahme noch Abnahme zeigten, in Abzug, und zwar:

78 Kinder gesunder Mütter,

33 Kinder erkrankter Mütter,

so dass sich die Summe unserer Statistik auf

602 Kinder beziffert.

Dem Zustande der Mutter nach, fanden wir folgende Verhältnisse in der Zunahme:

Normales Verhalten	402 Fälle	= 3 965,0 gr Zunahme	
1 Kind		= 9,8 gr	"
Rupt. perinei	38 "	= 375,0 gr	"
1 Kind		= 9,8 gr	"
Krankheiten des Darms etc.	11 "	= 107,0 gr	"
1 Kind		= 9,7 gr	"
Febris (aus verschied. Gründen).	12 "	= 114,0 gr	"
1 Kind		= 9,5 gr	"
Syphilis	6 "	= 57,0 gr	"
1 Kind		= 9,5 gr	"
Metrorrhagien	7 "	= 64,0 gr	"
1 Kind		= 9,1 gr	"
Puerperal-Krankheiten	20 "	= 176,0 gr	"
1 Kind		= 8,8 gr	"
Beckenanomalien	17 "	= 145,0 gr	"
1 Kind		= 8,5 gr	"
Wendungen (Repositio etc.)	11 "	= 89,0 gr	"
1 Kind		= 8,1 gr	"
Krankheiten der Mamma	47 "	= 379,0 gr	"
1 Kind		= 8,0 gr	"
Forceps	23 "	= 183,0 gr	"
1 Kind		= 7,9 gr	"
Lungenkrankheiten	5 "	= 29,0 gr	"
1 Kind		= 5,9 gr	"
Eklampsie	3 "	= 9,0 gr	"
1 Kind		= 3,0 gr	"

602 Fälle.

Abgesehen davon, dass bei normalem Verhalten der Mutter Altherr eine grössere Zunahme constatirt, als ich fand, ist sowohl der Abstand zwischen Kindern gesunder und kranker Mütter bei jenem Autor weit grösser, als auch ist die Reihenfolge der Krankheiten, je nachdem sie Einfluss auf grössere oder geringere Zunahme des Kindes zeigen, in meinen Tabellen eine durchaus andere.

Lassen wir die letzte Rubrik unserer Tafel beiseite, weil sie mir nicht eine genügende Zahl von Fällen zu enthalten

scheint, so sehen wir die durchschnittliche tägliche Gewichtszunahme bei Kindern kranker Mütter nur zwischen 9,8 gr (Rupt. perin.) und 5,9 gr (Lungenkrankheiten) schwanken, während Altherr rechnet, dass die durchschnittliche Zunahme durch Krankheit der Mutter von 10,6 gr (Rupt. perin.) bis zu 0,7 gr (Beckenanomalien) herabsinkt.

Was nun die Reihenfolge der Krankheiten betrifft, so zeigen dieselben ein fast normales Nahrungsvermögen derjenigen Mütter, die eine Rupt. perinei erlitten, dagegen zeigen die Puerperal-Krankheiten, die Erkrankungen des Darms, die Beckenanomalien keinen so bedeutenden Einfluss auf das Wachsthum des Kindes, wie Altherr es ihnen zuschreibt, während andererseits die Anlegung der Zange, die Krankheiten der Mamma eine tiefer greifende Bedeutung für die Ernährung des Kindes haben.

Alles in Allem scheinen mir weder die Altherr'schen Tabellen, noch die meinigen zu genügen, um einen grösseren Einfluss einer oder der anderen Krankheit der Mutter auf das Kind definitiv festzustellen; es bedarf dazu noch gründlicher Ausbeutung eines grossen Materials.

Allein so viel scheint mir festzustehen, dass Mamma-Erkrankungen, Puerperal-Krankheiten und Lungenleiden der Mutter zwar merklichen Einfluss auf das Wachsthum des Kindes zeigen, dass jedoch die normale Fortentwicklung dadurch keineswegs in Frage gestellt wird.

B. Die Ernährung der Neugeborenen.

Dass neben der Erkrankung der Mutter die Ernährung des Neugeborenen die grösste Bedeutung für das Gedeihen des Kindes hat, ist eine alte Erfahrung, die sich in den folgenden Zusammenstellungen bestätigt.

Wir finden unter den 2 032 Kindern, deren Wachstums-Verhältnisse wir besprachen, nicht weniger wie

1 393 Kinder = 68,5 0/0,

die mit Muttermilch ernährt wurden, und

639 Kinder = 31,4 0/0,

die neben Muttermilch mit künstlichen Surrogaten oder mit

letzteren allein ernährt wurden. Demnach wurde nur bei schweren Erkrankungen der Mütter oder sonst bei zwingenden Gründen von der normalen Ernährungsweise der Kinder abgegangen, und wir können im Grossen und Ganzen die im Vorangegangenen besprochenen Verhältnisse der Zunahme und Abnahme des Gewichts der Neugeborenen ohne Fehler auf die gesammte Anzahl der Kinder übertragen, sei es dass sie durch Muttermilch ernährt wurden, sei es dass bei ihnen eine künstliche Ernährung nothwendig wurde.

Allein es bleibt von Interesse, den Einfluss der Nahrung auf die Kinder zu beobachten, die während des Spitalaufenthaltes eine thatsächliche Zunahme erfuhren.

Unter den mehrfach erwähnten 713 Kindern, von denen 111 Kinder nur das Initial-Gewicht aufwiesen, befinden sich

618 mit Muttermilch genährte

95 künstlich ernährte Kinder,

in Procenten ausgedrückt: es wurden

44,3 0/0 der Kinder mit Muttermilch

14,8 0/0 der Kinder künstlich ernährt

und erreichten das Initial-Gewicht.

Die colossale Differenz für beide Ernährungsweisen bestätigt die alte Regel von dem hervorragenden Werth der Muttermilch gegenüber jeglicher anderen Nahrung.

Eine Zusammenstellung beweist nicht nur den Vorthail dieser Nahrungsweise, sie giebt auch Zeugniß von dem grösseren resp. geringeren Werth der übrigen Nahrungsmittel, die man dem Neugeborenen statt der Muttermilch zu geben häufig genug gezwungen ist.

Es wurden ernährt:

1. mit Muttermilch	618 Kinder	=	86,6 0/0
2. mit Kuhmilch	6 „	=	0,8 0/0
3. mit Kuh- und Muttermilch . .	16 „	=	2,2 0/0
4. mit Kuhmilch und Reismehl . .	4 „	=	0,5 0/0
5. Blumisberger Mehl	1 „	=	0,1 0/0
6. Muttermilch und Blumisberger Mehl	5 „	=	0,7 0/0

7. Chamermehl	7 Kinder =	0,9 0/0
8. Muttermilch und Chamermehl .	10 „ =	1,4 0/0
9. Condensirte Milch	10 „ =	1,4 0/0
10. Condensirte Milch und Mutter- milch	36 „ =	5,4 0/0
	713	

Es ist bei dieser Tabelle noch zu bemerken, dass nur einige unter den Kindern vom ersten Lebenstage an mit Kuhmilch oder einem Surrogat ernährt wurden, vielmehr wurde, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in den ersten Lebenstagen stets versucht, den Neugeborenen die mütterliche Milch zur Nahrung zu geben. Es wurden ausser der Kuhmilch verschiedene Präparate versucht, die meist nach Jahresfrist wieder aufgegeben wurden; einzig und allein fand die condensirte Milch länger dauernde Anwendung. Hinzugefügt sei hier noch, dass den künstlichen Präparaten häufig Schleim oder Eiweiss zugesetzt wurde.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Verhältnisse:

mit Muttermilch wurden 1 395 Kinder ernährt,

davon zeigten Zunahme 618 „ = 44,4 0/0

keine Zunahme 775 „ = 55,5 0/0.

Diese 618 Kinder zeigten zusammen eine durchschnittliche Zunahme von 6 287 gr, 1 Kind demnach 10,1 gr pro Tag.

Von den mit Kuhmilch ernährten Kindern zeigten:

6 Kinder = 19,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 3,1 gr „ „

Von den mit Kuh- und Muttermilch ernährten Kindern zeigten:

16 Kinder = 86,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 5,3 gr „ „

Von den mit Kuhmilch und Reismehl ernährten Kindern zeigten:

4 Kinder = 23,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 5,9 gr „ „

Mit Blumisberger Mehl ernährt erreichte

1 Kind das Initial-Gewicht.

Von den mit Blumisberger Mehl und Muttermilch ernährten Kindern zeigten:

5 Kinder = 40,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 8,0 gr „ „

Von den mit Chamermehl ernährten Kindern zeigten:

7 Kinder = 29,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 4,1 gr „ „

Von den mit Chamermehl und Muttermilch ernährten Kindern zeigten:

10 Kinder = 25,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 2,5 gr „ „

Von den mit condensirter Milch ernährten Kindern zeigten:

10 Kinder = 43,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 4,3 gr „ „

Von den mit condensirter Milch und Muttermilch ernährten Kindern zeigten:

36 Kinder = 182,0 gr durchschnittliche Zunahme,

1 Kind = 5,0 gr „ „

Wie schon früher müssen auch hier wir wieder geringere tägliche Zunahme constatiren, wie Altherr, der als durchschnittlichen Werth für die Ernährung mit Muttermilch 11 gr fand, als niedrigste Zunahme (bei Ernährung mit Nestle's Kindermehl) 4 gr nannte.

An täglicher Zunahme zeigte nach unserer Statistik ein Kind, das ernährt wurde:

1. mit Muttermilch	10,1 gr
2. mit Kuhmilch	3,1 gr
3. mit Kuh- und Muttermilch	5,3 gr
4. mit Kuhmilch und Reismehl	5,9 gr
5. mit Blumisberger Mehl	—
6. mit Blumisberger Mehl und Muttermilch	8,0 gr
7. mit Chamermehl	4,1 gr
8. mit Chamermehl und Muttermilch . .	2,5 gr
9. mit condensirter Milch	4,3 gr
10. mit condensirter Milch und Muttermilch	5,0 gr

Zur vollständigen Werthschätzung der einzelnen Ernährungsmittel bedarf es als Ergänzung des Vorangehenden noch eines Nachweises, wie viel Kinder überhaupt bei den verschiedenen Nahrungs-Methoden eine Zunahme erlebten; wir finden Folgendes:

Es zeigen Zunahme von

1 393	Kindern (Muttermilch)	618	Kinder = 44,3 %
38	„ (Kuhmilch)	6	„ = 15,6 %
114	„ (Kuhmilch u. Muttermilch)	16	„ = 15,0 %
18	„ (Kuhmilch und Schleim)	4	„ = 22,2 %
30	„ (Blumisberger Mehl)	1	„ = 3,3 %
49	„ (Blum. Mehl u. Muttermilch)	5	„ = 10,2 %
46	„ (Chamermehl)	7	„ = 15,2 %
79	„ (Chamermehl u. Muttermilch)	10	„ = 12,6 %
76	„ (Condensirte Milch)	10	„ = 13,1 %
168	„ (Cond. Milch u. Muttermilch)	36	„ = 21,4 %
9	„ (Schleim)	—	„ = —
12	„ (Eiweiss)	—	„ = —
2 032		713	

Bei Vergleichung dieser Tabellen zeigt sich nun, dass die Kinder, die durch Muttermilch ernährt wurden, nicht nur — wie schon früher erwiesen — die grösste Procentzahl aller Kinder bilden, die im Hospital das Initial-Gewicht erreichten, sondern auch dass sie die höchste tägliche Zunahme unter allen Neugeborenen (nämlich 10 gr.) aufweisen. Ein grosser Abstand findet sich in beiden Tafeln zwischen jenen Säuglingen und den ganz mit Präparaten oder theils mit Muttermilch, theils mit einem Surrogat aufgezogenen Kindern. Fast immer aber zeigen diejenigen bessere Verhältnisse, die wenigstens zum Theil Muttermilch erhielten.

Eine bedeutende Stellung nimmt sodann die Kuhmilch als Nahrungsmittel ein, da sie verhältnissmässig eine grosse Anzahl Neugeborner bis zu einer Zunahme im Spital brachte und die tägliche Durchschnittszunahme wenigstens fast ein Drittel der Zunahme betrug, die Neugeborene an der Mutterbrust erreichten.

Von den Präparaten ragt weit die condensirte Milch in ihrer Wirkung vor anderen Nährmitteln hervor; sie liefert eine

verhältnissmässig hohe tägliche Zunahme und stellt ein bedeutendes Contingent der Kinder, die überhaupt im Spital die Zunahme erlangten.

Von den übrigen Präparaten, die im Baseler Spital im Laufe der letzten zehn Jahre ausprobiert wurden, ist nicht viel Rühmenswerthes zu sagen; sie alle bringen die Kinder zu einer Zunahme von sehr wechselnder Höhe und die Procentzahl der Kinder, an denen eine Zunahme nachzuweisen ist, übertrifft bei allen nur um wenig 10% aller damit genährten Kinder.

Wir ziehen aus diesen Tabellen die Lehren, dass

1) Muttermilch anderen Nährmitteln wenigstens zuzusetzen ist, wenn dieselbe aus irgend einem Grunde nicht vollständig gegeben werden kann;

2) dass die besten Ersatzmittel für die Muttermilch in der Kuhmilch und der condensirten Milch sich präsentiren.

Den Werth der vorliegenden Arbeit möchte ich in zwei Richtungen suchen, in der nämlich, dass durch eine ausgebreitete Statistik früher bereits bekannte Thatsachen im Gebiete der Gewichts-Veränderungen Neugeborener neue, vielleicht endliche Bestätigung finden und in der Richtung, dass durch meine Studie in manchem Punkte neue Beleuchtung und neue Anregung geschaffen wird.

Werden diese Zwecke erreicht, so ist auch der Zweck meiner Arbeit erfüllt.

Ich fasse die Resultate der vorliegenden Schrift in folgenden Sätzen zusammen:

1. Völlig ausgetragene Neugeborene, Kinder von Multiparen und Knaben zeigen bei der Geburt höheres Gewicht als nicht reife Neugeborene, Kinder Primiparer und Mädchen. Die Differenz zwischen den Gewichten der Neugeborenen Primiparer und Multiparer ist eine geringere bei nicht vollständig ausgetragenen Kindern.

2. Die grösste Zahl der Neugeborenen verliert in den ersten Lebensstunden an Gewicht; jedoch findet sich bei 9% der Kinder eine Zunahme statt einer Abnahme.

3. Die Abnahme ist in den ersten drei Tagen von Kindern beiderlei Geschlechts beendet; Neugeborene Multiparer und reife Kinder haben im Durchschnitte rascher ihre Abnahme vollendet, wie Neugeborene Primiparer und nicht ausgetragene Kinder.

4. Die normale Höhe der Abnahme beträgt 100—300 gr.; Geschlecht und Reife des Kindes ist ohne Einfluss.

5. In der gleichen Zeit erreichen eine grössere Anzahl von Knaben das Initial-Gewicht als Mädchen, Knaben Multiparer in grösserer Zahl eine solche Primiparer.

6. Am siebenten Lebenstage hat die Hälfte der Neugeborenen das Initial-Gewicht wieder erreicht; nach dem 15. Tage ist ein Verbleiben unter dem Initial-Gewicht als Ausnahme zu betrachten.

7. Es erreichen mehr Knaben und Kinder Multiparer in der ersten Lebenswoche das Initial-Gewicht als Mädchen und Kinder Primiparer.

8. Während des Spital-Aufenthaltes zeigen mehr Knaben wie Mädchen eine Zunahme gegen das Initial-Gewicht, ebenso mehr Kinder Multiparer und vollständig reife.

9. Die gewöhnliche tägliche Zunahme beziffert sich auf 10 gr. Reife Kinder, Knaben und Früchte von Multiparen zeigen grössere tägliche Zunahmen.

10. Erkrankung der Mutter hat Einfluss auf die Entwicklung des Kindes; die Statistik weist den Neugeborenen von Lungenleidenden, Puerperalkranken und Operirten das schlechteste Wachsthum zu.

11. Wenn Muttermilch nicht als alleinige Nahrung gegeben werden kann, soll sie anderen Präparaten beigegeben werden; Kuhmilch und condensirte Milch sind die besten Ersatzmittel der Muttermilch.

Zum Schlusse meiner Arbeit sei es mir gestattet, an dieser Stelle meinen wärmsten Dank dem Herrn Professor Dr. Bischoff in Basel für die grosse Güte auszusprechen, mit der er mir die Mittel zu dieser Arbeit schaffte und mir Unterstützung gewährte.

Desgleichen fühle ich mich Herrn Professor Dr. Bollinger in München zu grossem Dank dafür verpflichtet, dass er das Präsidium über diese Arbeit freundlichst übernahm.
